

Qualiphar Polyseptol Pommade 22g

Traitement antibiotique local de :

- Infections bactériennes de la peau et des muqueuses.
- Risque de ce type d'infection.

Emploi :

Adulte : OK

Enfant > 2a. : OK

Enfant < 2a. : A éviter

- Appliquer 2 à 3 x par jour en couche mince!
- Si nécessaire, nettoyer la plaie préalablement avec une gaze stérile imbibée du sérum physiologique.
- Si nécessaire, faire un pansement de protection en utilisant d'abord des compresses stériles en contact avec la peau.
- Conseiller au patient de boire abondamment et de préférence des boissons alcalines.

Eviter toute application sur des plaies profondes, des ulcères.

Prudence en cas d'insuffisance rénale et/ou hépatique.

Eviter l'exposition des zones traitées au soleil vu le risque du développement d'une dermatite de sensibilisation.

Ingrédients :

Huile de foie de morue 125mg, filtrat polyvalent de bouillon de cultures, sulfanilamide 200mg /g pommade (contient de la lanoline)

Effets secondaires :

Fréquentes : réactions d'hypersensibilité, eczéma de contact, photosensibilisation, réactions allergiques (lanoline)

Rares : surinfection par des germes non sensibles, résorption systémique avec des complications hématologiques, rénales, urinaires et cutanées

Avertissements :

Grossesse : à éviter, certainement au dernier trimestre de la grossesse!

Lactation : à éviter! (passe par le lait maternel: risque accru d'ictère nucléaire chez le prématuré et le nouveau-né)

Conduite :OK